

**«Сигнальные показатели,
находящиеся на контроле Минздрава РФ и Росздравнадзора»
за 1 квартал 2021 года.**

№ п/п	Ключевые (сигнальные) индикаторы	Рекомендованные значения, %	Фактические значения показателей, %
1	1. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выживших больных, перенесших острый коронарный синдром, % <i>(показатель для ЛПУ 2-3 уровня)</i>	не менее 46,5%	0
2	2. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	менее 16,9%	100
3	3. Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания, %	не менее 35%	0
4	4. Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис, % (режимам химиотерапии, (из когорты 2014 г. для плана 2016 г.). <i>(показатель для ЛПУ 2-3 уровня)</i>	не менее 5%	0
5	5. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	менее 11%	0
6	6. Частота лечебных вмешательств с целью восстановления коронарного кровотока (тромболизис, чрескожные коронарные вмешательства) у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на ЭКГ в первые 12 ч от начала симптомов заболевания (%) режимам химиотерапии, (из когорты 2014 г. для плана 2016 г.). <i>(показатель для ЛПУ 2-3 уровня)</i>	не менее 80%	0
7	7. Доля лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в течение первого года после перенесенного острого коронарного синдрома (%)	не менее 80%	100
8	8. Доля населения субъекта Российской Федерации вакцинированного против гриппа	30% (на конец года)	0
9	9. Доля пострадавших в результате ДТП, госпитализированных в травм.центры 1 и 2 уровня, от всех пострадавших в результате ДТП, госпитализированных во все стационары субъекта РФ	не менее 82%	0
10	10. Доля случаев МЛУ,ШЛУ ТБ, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам химиотерапии, (из когорты 2014 г. для плана 2016 г.). <i>(показатель для ЛПУ 2-3 уровня)</i>	не менее 60%	0
11	11. Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения	не менее 95%	100
12	12. Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток-мкл, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза	не менее 95%	75,701
13	13. Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение из числа впервые в жизни установленным диагноз болезней печени и поджелудочной железы	не менее 70%	100
14	14. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 минут	не менее 95%	100
15	15. Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от числа всех заболевших пневмонией	не менее 85%	21,574
16	16. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение	не менее 23,4%	30
17	17. Частота выявления ЗНО при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.	0,1% или 1 ЗНО на 1000 прошедших ПМО и диспансеризацию	0,73